


DES
L'APPARITION
DES SIGNES
D'AMÉLIORATION
APRÈS LE DÉBUT DU
TRAITEMENT
NE CESSEZ PAS
DE PRENDRE
VOS MÉDICAMENTS,
VEUILLEZ TERMINER
VOTRE TRAITEMENT!



Une TÜRKİYE



Sans
TUBERCULOSE



LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
DIRECTION GÉNÉRALE
DE LA SANTÉ PUBLIQUE


Notre objectif une
TÜRKİYE
sans
TUBERCULOSE!



hsgm.saglik.gov.tr [f](#) [i](#) [x](#) [v](#) [i](#) [n](#) [c](#) /halksagligim

LE TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE (TUBERCULOSE) **EST GRATUIT DANS NOTRE PAYS!**

- ▶ La tuberculose n'est pas héréditaire, c'est une maladie contagieuse.
- ▶ La tuberculose est une maladie guérissable.
- ▶ Le traitement de la tuberculose dure au moins 6 mois. En cas de tuberculose résistante aux médicaments, cette durée peut s'allonger (18 à 24 mois).
- ▶ Chez la majorité des patients, la contagiosité disparaît 2 à 3 semaines après le début du traitement.



**“ En prenant vos
médicaments
régulièrement, vous
pouvez prévenir la
tuberculose et empêcher
sa transmission à votre
entourage ”**

**Traitement sous
surveillance directe (TSD);**
c'est l'administration de
chaque dose de médicament
à un patient tuberculeux
pendant toute la durée du
traitement, en présence
d'un agent de santé ou d'un
superviseur.

**“ Pour un traitement
efficace et réussi,
le Traitement
sous Surveillance
Directe (TSD) est
indispensable. ”**

- ▶ Ne cessez pas de prendre vos médicaments lorsque les signes d'amélioration apparaissent après le début du traitement. Terminez votre traitement jusqu'au bout.
- ▶ Une prise irrégulière des médicaments rend le traitement plus difficile et la contagiosité persiste.
- ▶ L'usage irrégulier des médicaments peut entraîner la tuberculose résistante.
- ▶ La tuberculose résistante nécessite un traitement plus long et un plus grand nombre de médicaments.
- ▶ En cas d'effet indésirable lors de la prise de vos médicaments, consultez immédiatement votre médecin.