




د ترکیه جمهوریت د روغتیا وزارت
د عامې روغتیا عمومي ریاست

زموږ هدف

له نړۍ رنځ
څخه پاکه
ترکیه ده!



ترکیه!

معنری رنځ څخه پار



حتی که چي تاسو د


درملنې له پیل

وروسته د روغیدو نښې

ووبښی، خپل درمل

اخیستل مه پریردئ او

خپله درملنه بشپړه کړئ!




” مستقیم څارل شوې درملنه د موثره او بریالۍ درملنې لپاره اړینه ده. “

- ▶ حتی کله چې د درملنې له پیل وروسته د روغیدو نښې وویښې، خپل درمل اخیستل مه پرېږدئ او خپله درملنه بشپړه کړئ.
- ▶ په غیر منظم ډول د درملو کارول به درملنه له خنډ سره مخ کړي او سرایت به دوام ومومي.
- ▶ په غیر منظم ډول د درملو کارول د درملو په وړاندې د مقاومت لرونکي نري رنځ لامل کیږي.
- ▶ د درملو په وړاندې مقاومت لرونکي نري رنځ د دې لامل کیږي چې ناروغان د اوږدې مودې لپاره ډیر درمل وکاروي.
- ▶ که چېرې د درملو د کارولو پر مهال موکوم ناڅاپي اغېزه ولیدله، ژر تر ژره له خپل ډاکټر سره مشوره وکړئ.



” تاسو کولی شئ په منظم درملو سره د نري رنځ مخه ونیستئ او د خپلو شاوخوا خلکو ته د نري رنځ له انتقال کولو څخه ډډه وکړئ. “



ترکیه د نري رنځ وړیا درملنه وړاندې کوي!

- ▶ نري رنځ جنیټیکي نه، بلکې یوه ساري ناروغي ده.
- ▶ نري رنځ یوه د درملنې وړ ناروغي ده.
- ▶ د نري رنځ درملنه لږ تر لږه 6 میاشتې دوام کوي. دا موده د درملو په وړاندې مقاومت لرونکي نري رنځ (18-24 میاشتې) کې اوږده دوام کوي.
- ▶ په ډیری ناروغانو کې، ساري ناروغي د درملنې له پیل څخه وروسته د 2-3 اونیو په اوږدو کې له منځه ځي.

مستقیم څارل شوې درملنه (DOT) پدې معنی ده چې د نري رنځ ناروغ د درملنې د بشپړې دورې لپاره د یوه باصلاحیته کس یا څارونکي په شتون کې د درملو هر دوز اخلي.

