



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
THSK AŞI İLE ÖNLENEBİLİR
HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI
29.01.2013 - 16:50:06 -
21001706/131.02/9133
00943134

Sayı : B.10.1.HSK.0.13.00.00
Konu: Suçiçeği Aşısı
Uygulaması

.....VALİLİĞİNE
(Halk Sağlığı Müdürlüğü)

Bağışıklama hizmetleri, Bakanlığımız tarafından yürütülen koruyucu sağlık hizmetlerinden biridir. Bu hizmetlerimiz her geçen gün yaygınlaştırılarak ve yeni aşılardan eklenmesi ile güçlendirilerek sürdürülmektedir.

Çocukluk dönemi aşı takvimine Suçiçeği aşısının eklenmesi ve uygulama stratejileri Bağışıklama Danışma Kurulu toplantılarında değerlendirilmiş olup Suçiçeği Aşısı uygulamasına 25.01.2013 tarihli ve 8078 sayılı Makam oluru ile başlanmasına karar verilmiştir.

Suçiçeği aşısı 1 Ocak 2012 ve sonrasında doğanlara yapılacaktır. Aşı 12. ayda olmak üzere tek doz halinde uygulanacaktır.

Genişletilmiş Bağışıklama Programı Daimi Genelgesi ve Aşı Sonrası İstenmeyen Etkiler Daimi Genelgesi yenilenerek en kısa sürede ilinize gönderilecektir. Ayrıca TSİM ve AHBS kayıt-bildirim sistemi yeni duruma göre uyarlanacaktır.

Aşının uygulama şekli, kontrendikasyonları ve çocukluk çağı aşı takvimi ile ilgili bilgi notu yazımız ekindedir. Bilgilerinizi ve bu önemli konunun ilinizde görevli ilgili tüm sağlık personeline imza karşılığı tebliğ edilmesi, konu hakkında öncelikle aşı uygulayanlardan başlamak üzere tüm sağlık personeline hizmetiçi eğitimlerin düzenlenmesi ve gereğini önemle arz ederim.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKSOY
Kurum Başkanı

Ek: 1-Yeni Çocukluk Dönemi Aşılama Takvimi ve
Suçiçeği Aşısının Uygulama Kuralları (2sf)
2- Makam Onayı

Dağıtım:
81 İl Valiliğine

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

SAYI : B.10.1.HSK.0.13.00.00
KONU : Suçiçeği Aşısı Uygulaması

.../.../2012

BAKANLIK MAKAMINA

Bağışıklama hizmetleri, Bakanlığımız tarafından yürütülen koruyucu sağlık hizmetlerinden biridir. Bu hizmetlerimiz her geçen gün yaygınlaştırılarak ve yeni aşılardan eklenmesi ile güçlendirilerek sürdürülmektedir.

Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) kapsamında boğmaca, difteri, tetanoz, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, tüberküloz, poliomyelit, Hepatit-B, Hepatit A, Hemofilus influenza tip b'ye bağlı hastalıklar ile streptokokus pnömoniya'ya bağlı invaziv pnömokokal hastalıkların ve bu hastalıklardan kaynaklanan bebek ve çocuk ölümlerinin ve sakatlıkların engellenmesi hedeflenmektedir.

Çocukluk dönemi aşı takviminde Suçiçeği aşısının eklenmesi ve uygulama stratejileri 08 Aralık 2011 ve 28 Haziran 2012 tarihlerinde yapılan Bağışıklama Danışma Kurulu toplantılarında değerlendirilmiştir. Suçiçeği aşısının 12. ayın sonunda tek doz olarak uygulanması kararlaştırılmıştır.

Ülkemizde aşı ile önlenebilir hastalıkların epidemiyolojik değerlendirmeleri, bilimsel veriler ve Bağışıklama Danışma Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda hazırlanan yeni Çocukluk Dönemi Aşılama takvimimizin ve Suçiçeği aşısına ilişkin ekte bulunan uygulama kurallarının yürütülmesi hususunu olurlarınıza arz ederim.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKSOY
Kurum Başkanı

Ek: Çocukluk Dönemi Aşılama Takvimi ve
Suçiçeği Aşısının Uygulama Kuralları (2 sf)

Uygun görüşle arz ederim.

Doç.Dr. Turan BUZGAN
Müsteşar Yardımcısı

OLUR
...../...../ 2012

Prof. Dr. Nihat TOSUN
Bakan a.
Müsteşar

Sayı : B.10.1.HSK.0.13.00.00

Konu: Suçiçeği Aşısı
Uygulaması

SUÇİÇEĞİ AŞISI UYGULAMA KURALLARI

Suçiçeği Aşısı Uygulaması:

- Aşı tek dozluk, liyofilize içeren flakon ve çözücü içeren flakon veya enjektör şeklinde sunulmaktadır. Çözücünün liyofilize içeren flakona eklenmesi yoluyla kullanıma hazırlanır. Çözücünün eklenmesinden sonra iyice karışması için yavaşça çalkalanmalıdır. Hazırlandıktan sonra aşı hemen kullanılmalıdır.
- Kolun üst kısmına, deltoid kasa uyan bölgeye yapılır. Kol dirsekten 45° içe bükülür, enjektör 45° eğimle cildi geçerek, cilt altına (subkutan, SC) uygulanır.
- 0,5 ml uygulanır.
- Diğer çocukluk çağı aşılarıyla birlikte aynı anda uygulanabilir. Suçiçeği ve KKK aşısı aynı zamanda uygulanamayacak ise en az 28 gün ara ile uygulanmalıdır.

Suçiçeği Aşısının Saklanması:

- İl deposunda, aşı (+2)-(+8) °C'de saklanmalıdır, kesinlikle dondurulmamalıdır. Sağlık Kurumunda buzdolabının orta rafında saklanmalıdır, kesinlikle dondurulmamalıdır.
- Sulandırmadan önce ışıktan korunmalıdır.
- Aşı depolama kapasitesi ihtiyacındaki artış dikkate alınarak mevcut altyapı İl Aşı Sorumlusu ve İl Soğuk Zincir Sorumlusu tarafından yerinde değerlendirilmeli ve ihtiyaç olan kurumlarda geniş kapasiteli, çift kapılı, no-frost buzdolapları acilen temin edilmelidir.

Genel Aşı Kontrendikasyonları:

- Bir aşıya karşı gelişen anafilaktik reaksiyon, o aşının sonraki dozları için kesin kontrendikasyon oluşturur.
- Bir aşı bileşenine karşı gelişen anafilaktik reaksiyon, bu maddeyi içeren tüm aşılar için kesin kontrendikasyon oluşturur.
- Ateşli veya ateşsiz ciddi hastalık durumunda, izleyen hekime danışılmadan aşı uygulanmaz.

Aşıya özel durumlar :

Kesin Kontrendikasyonlar;

- Önceki aşı dozunu takiben gelişen ya da aşının bir bileşenine karşı gelişmiş ciddi allerjik reaksiyon,
- İmmüntenin baskılandığı durumlar (İmmunosupresif tedavi, immün yetmezlik hastalıkları, lösemi, lenfoma, yaygın malinite vb),
- Gebelik (Varicella aşısının uygulanmasını takiben 1 ay gebelikten kaçınılmalıdır.)

Salisilat kullanımı

Önlem alınarak uygulanacak durumlar;

- Orta derecede ya da ciddi akut hastalık,
- Yakın zamanda kan ve kan ürünü almış olma

Sayı : B.10.1.HSK.0.13.00.00
Konu: Suçiçeği Aşısı
Uygulaması

Aşı uygulanmasından sonra 6 hafta süresince salisilat kullanımdan kaçınılmalıdır.

Çocukluk Dönemi Aşılamaya Takvimi

A) Okul Öncesi Aşılamalar:

- Doğumda (İlk 72 saat içinde)
Hep B-1
- 1. Ayın bitiminde
Hep B-2
- 2. Ayın bitiminde
DaBT-İPA-Hib-1, BCG, KPA-1
- 4. Ayın bitiminde
DaBT-İPA-Hib-2, KPA-2
- 6. Ayın bitiminde
DaBT-İPA-Hib-3, OPA, Hep B-3, KPA-3
- 12. Ayın bitiminde
KKK, KPA-R, Suçiçeği
- 18. Ayın bitiminde
DaBT-İPA-Hib-R, OPA, Hep A-1
- 24. Ayın bitiminde
Hep A-2
(Hep A-1'den en az 6 ay sonra)

B) Okul Aşılamaları:

- İlköğretim 1. sınıfta
KKK-R, DaBT-İPA-R
- İlköğretim 8. sınıfta
Td

Çocukluk Dönemi Aşılamaya Takvimi

	Doğumda	1.ayın sonu	2.ayın sonu	4.ayın sonu	6.ayın sonu	12. ayın sonu	18. ayın sonu	24. ayın sonu	İlköğretim 1.sınıf	İlköğretim 8. sınıf
Hep-B	I	II			III					
BCG			I							
DaBT-İPA-Hib			I	II	III		R			
KPA			I	II	III	R				
KKK						I			R	
DaBT-İPA									R	
OPA					I		II			
Td										R
Hep-A							I	II		
Suçiçeği						I				

Hep-B: Hepatit B Aşısı

BCG: Bacille Calmette-Guerin Aşısı

DaBT-İPA-Hib: Difteri, aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio, Hemofilus influenza tip b Aşısı (Beşli Karma Aşı)

KKK: Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak Aşısı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Refik Saydam Yerleşkesi

Sağlık Mahallesi, Adnan Saygun Caddesi No:55

G Blok 1. Kat, 06100 Sıhnye/Ankara

Tel: (312) 565 56 61

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Sayı : B.10.1.HSK.0.13.00.00

Konu: Suçiçeği Aşısı
Uygulaması

DaBT-İPA: Difteri, aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio Aşısı (Dörtlü Karma Aşı)
OPA: Oral Polio Aşısı
Td: Erişkin Tipi Difteri-Tetanoz Aşısı
KPA: Konjuge Pnömonokok Aşısı
R: Rapel (Pekiştirme)
Hep-A: Hepatit A Aşısı.