

1 HIV ANNEDEN BEBEĞE NASIL GEÇER?

- Gebelik sürecinde;** plasenta (bebek eşi) yolu ile
- Doğum sırasında;** annenin doğum kanalındaki sıvıları ve kanı ile
- Doğum sonrasında;** emzirme ile enfeksiyon bebeğe geçebilir.



2 ANNEDEN BEBEĞE GEÇİŞ ÖNLENEBİLİR Mİ?

EVET

- Alınacak önlem ve tedaviler ile bebeğe geçiş riski oldukça azalmakta (%1 veya daha düşük) ve bebeğin sağlığı HIV açısından korunmaktadır.
- Gebelik öncesi başlanan HIV tedavisinin gebelik süresince devamı veya gebelikte HIV tespit edilmesi durumunda tedaviye başlanmalıdır.
- Çeşitli kaynaklarda doğum şekli olarak planlanmış sezaryen önerilse de ilgili hekimlerin ortak kararı önemlidir. Doğum sırasında anneye, doğum sonrası bebeğe koruyucu tedavi uygulanmalı ve emzirmeme sağlanmalıdır.

HIV ENFEKSİYONU AÇISINDAN KENDİNİZİ RİSK ALTINDA DÜŞÜNÜYORSANIZ

HIV enfeksiyonu durumunuzu öğrenmek için **en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.** Bu sayede hem kendi sağlığını hem de bebeğinizin sağlığını koruyun.

3 HIV TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR GEBELİKTE GÜVENLİ MİDİR?

EVET

- HIV tedavisinde kullanılan ilaçların büyük bir kısmının gebelikte kullanımı güvenlidir. Genel olarak bu ilaçların bebeğe yönelik olumsuz etkileri bulunmamaktadır.

UYGUN ŞEKİLDE ÖNLEM ALINMAYAN VE TEDAVİ UYGULANMAYAN HIV POZİTİF HER 3 ANNEDEN BİRİNDE VİRÜS BEBEĞE GEÇMEKTEDİR

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Mah. A. Adnan Saygun 2. Cad. No: 55
06100/ Sıhhiye/ Çankaya/ Ankara
Tel: +90 312 565 50 00

hsgm.saglik.gov.tr

hsgm.saglik.gov.tr



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
HALK SAĞLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GEBELİK VE HIV/AIDS



>> HIV NEDİR?

- “İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü” HIV olarak adlandırılmaktadır.
- Bu virüs, bağışıklık sistemini zayıflatır ve tedavi edilmediğinde ciddi hastalıklara (enfeksiyonlar, kanserler vb.) ve ölüme neden olur.

>> HIV POZİTİF NEDİR?

- Kişinin kanında HIV enfeksiyonunun saptanmasıdır.

>> HIV ENFEKSİYONUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Hastalığın evresine göre belirtiler değişkenlik gösterir.
- Bazı kişilerde virüs ile ilk karşılaşmadan 2-4 hafta sonra grip benzeri belirtiler (ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı, yoğun kas ve eklem ağrısı, karın ağrısı, ishal, döküntü, lenf bezlerinde şişlik ve ağrı vb.) görülebilir. Bazı kişilerde ise bu dönemde hiçbir belirti görülmeyebilir.
- Birkaç hafta sürebilen bu dönemden sonra enfeksiyon uzun bir dönem (yaklaşık 5-10 yıl) sessiz seyredebilir ve AIDS evresine ilerleyebilir.

ERKEN BAŞLANAN VE YAŞAM BOYU DEVAM EDİLEN İLAÇ TEDAVİSİ SAYESİNDE;

HIV ENFEKSİYONU OLAN KİŞİLER SAĞLIKLI BİREYLERLE AYNI YAŞAM SÜRESİNİ YAŞAYABİLİRLER

>> AIDS NEDİR?

- HIV enfeksiyonunun tedavi edilmediği takdirde bağışıklık sistemine ciddi düzeyde zarar vermesi sonucunda ortaya çıkan “Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu” dur.

>> TANI

- Enfeksiyona özgü laboratuvar testleri ile tanı konulmaktadır.



>> BULAŞMA YOLLARI

- **Cinsel Temas:**
(En sık görülen bulaşma yoludur)

HIV pozitif kişi ile korunmasız (kondom kullanılmadan) yapılan her türlü (oral, vajinal, anal) cinsel ilişki.

- **Kan Yolu ile Bulaşma:**

Ortak kullanılan HIV ile kontamine iğne, şırınga ve diğer delici kesici aletler veya steril edilmemiş cerrahi malzemelerin kullanıldığı işlemler (dövme, piercing vb.).

Enfekte kan ve kan ürünleri nakli (*Ülkemizde 1987 yılından itibaren, her kan ve kan ürününe gerekli testler yapıldıktan sonra hastaya verilmektedir.*).

- **Anneden Bebeğe Geçiş:**

HIV pozitif anneden gebelik dönemi, doğum sırasında ya da doğum sonrasında bebeğe geçiş (emzirme vb.).

TÜM GEBELERE BİLGİSİ VE ONAYI DAHİLİNDE HIV TESTİ ÖNERİLMEKTEDİR