

Dil ve İletişim Becerileri

0-3 ay arası

Anne sesini tanır ve sakinleşir. Yüksek seslere irkilir, besleniyorsa duraksar.

3-6 ay arası

Gürültüde uyanır çevresindeki seslerin nereden geldiğini bulmak için sesin kaynağına döner.

6-12 ay arası

Da da, ba ba gibi sesleri algılar. Adı söyleince tepki verir. Çıngırak sesi gibi oyuncak seslerinden hoşlanır.

12-18 ay arası

Ba ba da da gibi sesler çıkarır. Sevdiği oyuncakların, eşyaların adı söylenince işaretle gösterir. Uzaktan seslendiğinde bakar.

18-24 ay arası

20'ye yakın kelime söyler. İki kelimelik cümleler kurar. Basit komutları yerine getirir.

24 ay - 3 yaş arası

24 aylıkken 270, 3 yaş yaşında 1000 kadar kelime haznesi vardır. İsteklerini genellikle sözel olarak bildirir. Basit cümlelerle konuşur. Farklı sesleri ayırt eder. Kendisine söyleyenleri anlar.

Çocuğunuzun dil gelişiminde gecikme var ise Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanına başvurunuz.



En değerli varlığınız olan çocuğunuzun işitebilmesi ve konuşmayı öğrenebilmesi, onun en temel hakkıdır!

hsgm.saglik.gov.tr

[f](#) [i](#) [x](#) [v](#) [in](#) [c](#) /halksagligigm



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
HALK SAĞLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Bebeğiniz Sizi Duyuyor Mu?

İşitme Kaybı

İşitme kaybı, çok hafif dereceden çok ileri dereceye kadar farklılık gösteren işitmedeki yetersizliktir.

En sık görülen doğumsal bozukluklardan birisidir.

Doğumsal işitme kaybı olan bebeğin başta dil ve konuşma gelişimi olmak üzere sosyal, bilişsel ve psikolojik gelişim alanları da olumsuz etkilenir.

İşitme kayıpları ne kadar erken dönemde meydana gelirse, çocuğun gelişimini o derecede etkiler.

İşitme kayıplı bir bebeğin erken dönemde tanımlanması, tedavi edilmesi ve rehabilitasyon programlarına dahil edilmesi çok önemlidir.



Bebeğinize hastaneden taburcu olmadan önce işitme tarama testini yaptırınız.

Yenidoğan Bebeklerde İşitme Kaybı Risk Faktörleri

Doğum Öncesi Dönemde:

1. Ailede çocukluk çağına başlayan işitme kaybı öyküsü var mı?
2. Anne hamileliği sırasında ilaçlar kullandı mı?
3. Anne hamileliği sırasında bulaşıcı hastalıklar geçirdi mi?
4. Anne hamileliği sırasında yüksek tansiyon, şeker hastalığı, böbrek yetmezliği vb. sistematik bir hastalık geçirdi mi?
5. Anne hamileliği sırasında herhangi bir kaza, çarpma ve yaralanma geçirdi mi?

Doğum Sırasında:

1. Bebeğiniz doğum anında oksijensiz kaldı mı?
2. Bebeğiniz doğum sonrası bir süre solunum zorluğu yaşadı mı?
3. Bebeğinizin doğum ağırlığı 1500 gramın altında mı?
4. Bebeğiniz yeni doğan yoğun bakım ünitesinde 5 günden fazla kaldı mı?
5. Bebeğinizin kafa veya kulak yapısında normal dışı bir durum söz konusu mu?
6. Bebeğiniz herhangi bir kafa travması geçirdi mi?

Doğum Sonrasında:

1. Bebeğiniz yüksek ateşle seyredilebilen bir hastalık geçirdi mi?
2. Kan değişimi gerektiren bir sarılığı oldu mu?
3. Çocuğunuza damar yoluyla kulağa zararı dokunabilecek bir ilaç verildi mi?



Bebeğiniz

işitme tarama testinden geçse bile **risk faktörü taşıyorsa** sağlık personeli tarafından verilen bilgiler doğrultusunda bebeğinizi belli aralıklarla bir üst tanı merkezine götürünüz.