

## Asbest Teması Nedenli HASTALIKLAR ve KANSER

1990 yılında ak toprak kullanımı azalmaya başlamakla beraber bugün için Türkiye’de kırsal alanda yaşama nedeniyle asbest ile temaslı 1.000.000 civarında kişinin yaşadığı, yaklaşık 90.000 kişinin de temasa devam ettiği öngörülmektedir.

Asbest solunum yolu maruziyeti sonrası solunum sisteminde farklı patolojilere ve/veya kansere (akciğer kanseri, mezotelyoma) neden olmaktadır.

Asbest 20.yy’ın ilk çeyreğinden itibaren Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Kanser Araştırma Merkezi’nin “Kanserojen Maddeler” listesinde insan için kanserojen (Grup IA) olarak tanımlanmıştır.

## MEZOTELYOMA NEDİR?

Son yıllarda ülkemizde sıkça görülmesine rağmen nadir tümörler arasında yer alan mezotelyoma, akciğer, kalp ve karın organlarını çevreleyen sırasıyla plevra, perikard ve periton adı verilen zararlardan orjin olan habis bir tümördür. Çoğu kez asbest maruziyetine bağlı olarak ortaya çıkan bu tümör, en fazla plevrada (akciğer zarı) görülür.

Hastalık çoğunlukla akciğer zarında sıvı birikimine yani plöreziye neden olduğu için ilk belirtiler çoğu kez sırt, göğüs ve yan ağrısıdır. Başlangıçta nefes almakla batıcı karakterde olan ağrı, giderek süreklilik kazanır ve şiddetini artırır. Plevra boşluğunda biriken sıvı miktarının artması ile hastada nefes darlığı ortaya çıkar. Bunun dışında öksürük, nadiren çomak parmak, hastalığın yaygınlığı ile ilişkili olarak karında şişme, karın ağrısı gibi belirtiler de olabilir.



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
HALK SAĞLIĞI  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

## ASBEST ve KANSER



**HAYATINIZ BİZİM İÇİN DEĞERLİDİR**



[www.kanser.gov.tr](http://www.kanser.gov.tr)