

تتطلب الوقاية من مرض حبة الشرق أخذ الاحتياطات  
اللازمة التالية:

إرتداء الملابس التي تغطي كافة اجزاء الجسم وعدم البقاء  
لمدة طويلة في الاماكن المكشوفة بعد الغروب.

إستخدام ناموسيات واقية للنوافذ خاصة بحشرة ذبابة الرمل.

إستخدام ناموسيات واقية حول السرير خاصة بذبابة الرمل.

إستخدام طارد ذباب.

إستخدام أجهزة تهوية في الاماكن المغلقة مثل المراوح  
لتشكيل تيار هواء.

عدم ترك المخلفات والاسمدة العضوية مكشوفة.

إنشاء الحظائر على مسافة موصى بها من المنازل.

عمل اللياسة لجدران المنازل والحظائر ومعاملتها بطبقة من  
الكلس والمحافظة على نظافتها.



**جفف مستنقعات المياه الموجودة  
بجوار المنازل !!!**

لأن كل 1 متر مربع من هذه المستنقعات  
يمكن أن يتواجد فيها عشرات الآلاف من  
بيوض ذبابة الرمل.



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
HALK SAĞLIĞI  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**T.C. Sağlık Bakanlığı**

الجمهورية التركية وزارة الصحة

# الليشمانيا او حبة الشرق

(داء الليشمانيا الجلدي)



**T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI**

الجمهورية التركية وزارة الصحة

يلاحظ الإصابة بالمرض في اجزاء الجسم المكشوفة بكثرة في الوجه واليدين والقدمين



### حبة الشرق

تنتشر داء الليشمانيات من جراء لدغ ذبابة الرمل (ذبابة الفاصدة) الحاملة للطفيلي المسبب لمرض الليشمانيات وهي مرض جلدي.



تبدأ الإصابة في الوجه واليدين والقدمين والذراعين في الاجزاء المكشوفة من الجسم على شكل حبة شباب أخذة بالإتساع وبدون ألم.

**يجب مراجعة أقرب مركز صحة في حال استمرار الإصابة بالمرض لمدة تجاوزت الشهر!**

في حال عدم اللجوء إلى العلاج: تترك آثار مستديمة في الجلد، تقوم ذبابة الرمل بنقل طفيلي مرض الليشمانيات إلى ناس آخر وذلك بتموضعها على الجروح الملتهبة .



### ذبابة الرمل (ذبابة الفاصدة):

تتواجد ذبابة الرمل غالبا في الحظائر، والجحور، واكوام الاسمدة العضوية، والتشققات الموجودة في جذوع الأشجار، وتشققات الجدران، وأعشاش القوارض أثناء النهار، وتنشط الحشرة في الليل مشكلة خطورة للبشر.



**ضرورة العلاج في حالة الإصابة!**

تقوم وزارة الصحة بتوفير الأدوية المستخدمة في علاج مرض حبة الشرق **مجانا**.



**T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI**

الجمهورية التركية وزارة الصحة