




جمهوری ترکیه وزارت بهداشت
و درمان
اداره کل سلامت عمومی

هدف ما یک ترکیه عاری از سل است

یک ترکیه عاری از سل



TÜRKİYE!



پس از شروع درمان
،وقتی علائم بهبودی را مشاهده کردید
نکنید و دوره

• سل یک بیماری عفونی است، نه ارثی

• سل یک بیماری قابل درمان است

طول دوره درمان سل حداقل 6 ماه است. طول این دوره در سل مقاوم در برابر دارو طولانی‌تر می‌شود (18-24 ماه).

در اکثر بیماران 2-3 هفته پس از شروع درمان امکان سرایت بیماری از بین می‌رود.

درمان تحت نظارت مستقیم به معنی این است که بیمار مبتلا به سل، تمام دوزهای دارویی خود را در حضور یک مسئول یا ناظر مصرف کند.



برای یک درمان موثر و موفقیت‌آمیز، درمان با نظارت مستقیم الزامی است

در صورت مشاهده علائم بهبودی مدتی پس از شروع درمان، مصرف داروهای خود را قطع نکنید و طول دوره درمان را کامل کنید.

مصرف نامنظم دارو، درمان را مشکل می‌کند و امکان سرایت بیماری ادامه می‌یابد.

مصرف نامنظم دارو منجر به سل مقاوم می‌شود.

سل مقاوم به مصرف داروی طولانی‌تر و بیشتری نیاز دارد.

اگر هنگام مصرف داروهای تجویز شده با عوارض غیرمنتظره‌ای مواجه شدید، در اسرع وقت با پزشک خود مشورت کنید.

