


**ЕСЛИ ПОСЛЕ НАЧАЛА  
ЛЕЧЕНИЯ  
У ВАС ПОЯВИЛИСЬ  
ПРИЗНАКИ УЛУЧШЕНИЯ  
САМОЧУВСТВИЯ, НЕ СЛЕДУЕТ  
ПРЕКРАЩАТЬ ПРИЕМ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ,  
НЕОБХОДИМО ПОЛНОСТЬЮ  
ЗАВЕРШИТЬ КУРС ЛЕЧЕНИЯ**



**ТУРЦИЯ**



**БЕЗ ТУБЕРКУЛЁЗА!**



**Турецкая Республика  
МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ОБЩЕСТВЕННОГО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

**Наша цель -  
Турция БЕЗ ТУБЕРКУЛЁЗА!**




## НАШЕЙ СТРАНЕ ЛЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА БЕСПЛАТНО!

▶ ТУБЕРКУЛЁЗ - инфекционное, но не наследственное заболевание.

▶ ТУБЕРКУЛЁЗ поддается лечению.

Лечение туберкулёза занимает не менее 6 месяцев. При лекарственно - устойчивом туберкулёзе продолжительность лечения увеличивается (18-24 месяца).  
У большинства пациентов через недели проявления контагиозности исчезают.



**“При регулярном приеме лекарственных препаратов возможно предотвращение туберкулёза, инфицирование окружающих.”**

Лечение под непосредственным наблюдением (DGT) означает, что больной туберкулёзом принимает каждую дозу лекарств в присутствии сопровождающего или наблюдающего специалиста в течение всего курса лечения.

**“Для достижения эффективного и успешного результата необходимо лечение под прямым наблюдением.”**

Не следует прекращать прием лекарственных препаратов при появлении признаков улучшения через некоторое время после начала лечения, необходимо завершить курс лечения.

При нерегулярном приеме лекарственных препаратов затрудняется процесс лечения, и инфекционность продолжается.

Нерегулярное употребление лекарственных препаратов способствует развитию устойчивости туберкулёза.

При устойчивом туберкулёзе требуется более длительное и интенсивное лечение.

При возникновении побочных эффектов во время приема лекарственного препарата необходимо незамедлительно проконсультироваться с лечащим врачом.